

Levonol

Levofloxacin

COMPOSITION

Levonol 500 Tablet: Each film coated tablet contains Levofloxacin 500 mg as Levofloxacin Hemihydrate USP.

PHARMACOLOGY

Levonol (Levofloxacin) is a synthetic, broad-spectrum, third generation fluoroquinolone derivative antibacterial agent for oral administration. Chemically, Levofloxacin is a chiral fluorinated carboxyquinolone which is the pure (-) enantiomer of the racemic drug, ofloxacin.

INDICATIONS

Levonol (Levofloxacin) is indicated for the treatment of mild to moderate, and severe infections caused by susceptible strains of the designated microorganism in the conditions listed below:

- Acute maxillary sinusitis due to *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, or *Moraxella catarrhalis*.
- Acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis due to *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, or *Moraxella catarrhalis*.
- Community-acquired pneumonia due to *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis*, *Chlamydia pneumoniae*, *Legionella pneumophila*, or *Mycoplasma pneumoniae*.
- Uncomplicated & complicated skin and skin structure infections (mild to moderate) including abscesses, cellulitis, furuncles, impetigo, pyoderma, wound infections, due to *Staphylococcus aureus*, or *Streptococcus pyogenes*, *Proteus mirabilis*, *Enterococcus faecalis*.
- Complicated urinary tract infections (mild to moderate) due to *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Staphylococcus saprophyticus*.
- Acute pyelonephritis (mild to moderate) caused by *Escherichia coli*.
- Enteric fever caused by *Salmonella typhi* & *Salmonella paratyphi*.

DOSAGE & ADMINISTRATION

- Acute Sinusitis, 500 mg once daily for 10-14 days
- Exacerbation of chronic bronchitis, 250-500 mg once daily for 7 days
- Community-acquired pneumonia, 500 mg once daily for 7-14 days
- Community-acquired pneumonia, 750 mg once daily for 5 days
- Nosocomial Pneumonia, 750 mg once daily for 7-14 days
- Complicated urinary-tract infections and acute pyelonephritis, 250 mg daily for 7-10 days
- Uncomplicated UTI, 250 mg once daily for 3 days
- Acute pyelonephritis, 250 mg once daily for 10 days
- Chronic bacterial prostatitis, 500 mg once daily for 28 days
- Uncomplicated skin and soft-tissue infections, 500 mg once daily for 7-10 days
- Complicated skin and soft-tissue infections, 750 mg once daily for 7-10 days

CONTRAINDICATION

Levofloxacin is contraindicated in patients with a history of hypersensitivity to Levofloxacin, quinolone antimicrobial agents, or any other components of this product.

PRECAUTION

While taking levofloxacin, adequate amount of water should be drunk to avoid concentrated form of urine. Dose adjustment should be exercised during Levofloxacin ingestion in presence of renal insufficiency.

SIDE EFFECT

Levofloxacin is generally well tolerated. However, a few side effects can usually be seen. Side effects include: nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, flatulence and rare occurrence of phototoxicity (0.1%). Side effects that may be seen very rarely include tremors, depression, anxiety, confusion, etc.

USE IN PREGNANCY & LACTATION

Levofloxacin is not recommended for use during pregnancy or nursing, as the effects on the unborn child or nursing infant are unknown.

DRUG INTERACTION

Antacids, iron, adsorbents and multivitamin preparations with zinc reduce absorption of Levofloxacin.

OVERDOSAGE

In the events of an acute over dosage, the stomach should be emptied. The patients should be kept under observation and appropriate hydration should be maintained.

STORAGE

Do not store above 30°C, protect from light & moisture. Keep out of the reach of children.

PACKAGING

Levonol 500 Tablet : Each box contains 3×10 tablets in blister pack.

Manufactured by
National Drug Co. Ltd.
Bangalpara, Dhamrai, Dhaka.

লিভোনাল

লিভোফ্লক্সাসিন

উপাদান

লিভোনাল ৫০০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে লিভোফ্লক্সাসিন ৫০০ মি.গ্রা. লিভোফ্লক্সাসিন হেমিহাইড্রেট ইউএসপি হিসাবে।

ফার্মাকোলজি

লিভোনাল (লিভোফ্লক্সাসিন) একটি কৃত্রিম বিস্তৃত বর্ণালীর তৃতীয় প্রজন্মের ফ্লুরোকুইনোলোন শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া রোধী ওষুধ যা মুখে সেবন করা যায়। রাসায়নিকভাবে লিভোফ্লক্সাসিন একটি কাইরাল ফ্লুরিনেটেড কার্বোক্সিকুইনোলোন যা ওফ্লক্সাসিনের রেসিমিক মিশ্রণের বিশুদ্ধ (-) এনানসিওমার।

নির্দেশনা

লিভোনাল (লিভোফ্লক্সাসিন) নিম্নলিখিত সংবেদনশীল জীবাণু দ্বারা ঘটত মৃদু, মধ্যম থেকে তীব্র সংক্রমণে ব্যবহার করা যায়-

- স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েনজি অথবা মোরাক্সিলা ক্যাটারালিস প্রভৃতি দ্বারা ঘটত তীব্র ম্যাক্সিলারি সাইনাসের প্রদাহ।
- স্ট্রেপটোকক্কাস অরিয়াস, স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েনজি, হিমোফিলাস প্যারা-ইনফ্লুয়েনজি অথবা মোরাক্সিলা ক্যাটারালিস দ্বারা ঘটত দীর্ঘদিনের ব্রঙ্কাইটিসের হঠাৎ বৃদ্ধি।
- স্ট্রেপটোকক্কাস অরিয়াস, স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েনজি, হিমোফিলাস প্যারা-ইনফ্লুয়েনজি, ক্রেবসিয়েলা নিউমোনি, মোরাক্সিলা ক্যাটারালিস, ক্লেমাইডিয়া নিউমোনি, লেজিওনেলা নিউমোফিলা অথবা মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি দ্বারা ঘটত কমিউনিটি এ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া।
- স্ট্রেপটোকক্কাস অরিয়াস, স্ট্রেপটোকক্কাস পায়োজেনস, প্রোটিয়াস মিরাবিলিস অথবা এন্টারোকক্কাস ফেফালিস দ্বারা ঘটত ত্বক ও ত্বকের অঙ্গগুলি এবং জটিল সংক্রমণ যথা স্ফোটক, কৌষিকবিষ্টির প্রদাহ, ফোঁড়া, পীতবর্ণ পীড়কা, পূজকারক, চর্ম রোগ, ক্ষত ইত্যাদি।
- ই. কোলাই, ক্রেবসিয়েলা নিউমোনি অথবা স্ট্রেপটোকক্কাস সেপ্তোফাইটিকাস দ্বারা ঘটত মুত্রনালীর জটিল সংক্রমণ।
- ই. কোলাই ঘটত বৃক্কের তীব্র প্রদাহ।
- সালমোনেলা টাইফি এবং সালমোনেলা প্যারাটাইফি দ্বারা গঠিত টাইফয়েড জ্বর।

মাত্রা ও সেবনবিধি

- তীব্র ম্যাক্সিলারি সাইনাসের প্রদাহে দৈনিক একবার ৫০০ মি.গ্রা. করে ১০ থেকে ১৪ দিন।
- পুরনো ব্রঙ্কাইটিসের হঠাৎ বৃদ্ধিতে দৈনিক একবার ২৫০-৫০০ মি.গ্রা. করে ৭ দিন।
- কমিউনিটি এ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়াতে দৈনিক একবার ৫০০ মি.গ্রা. করে ৭ থেকে ১৪ দিন।
- কমিউনিটি এ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়াতে দৈনিক একবার ৭৫০ মি.গ্রা. করে ৫ দিন।
- নসকমিয়াল নিউমোনিয়াতে দৈনিক একবার ৭৫০ মি.গ্রা. করে ৭ থেকে ১৪ দিন।
- মুত্রনালীর জটিল সংক্রমণে দৈনিক ২৫০ মি.গ্রা. করে ৭ থেকে ১০ দিন।
- মুত্রনালীর অঙ্গগুলি সংক্রমণে দৈনিক ২৫০ মি.গ্রা. করে ৩ দিন।
- ব্যাকটেরিয়ার কারণে বৃক্কের তীব্র প্রদাহে দৈনিক ২৫০ মি.গ্রা. করে ১০ দিন।
- ব্যাকটেরিয়া জনিত প্রস্টেট প্রদাহে দৈনিক ৫০০ মি.গ্রা. করে ২৮ দিন।
- ত্বক এবং নরম কলার অঙ্গগুলি সংক্রমণে দৈনিক ৫০০ মি.গ্রা. করে ৭ থেকে ১০ দিন।
- ত্বক এবং নরম কলার জটিল সংক্রমণে দৈনিক ৭৫০ মি.গ্রা. করে ৭ থেকে ১০ দিন।

বিপরীত নির্দেশনা

যে সমস্ত রোগী লিভোফ্লক্সাসিন, ব্যাকটেরিয়া বিরোধী কুইনোলোন এজেন্ট অথবা লিভোফ্লক্সাসিন এর যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রতিনির্দেশিত।

সতর্কতা

লিভোফ্লক্সাসিন সেবনের সময় মূত্রের ঘনত্ব কমানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পানি পান করা উচিত।

বৃক্কের জটিলতা যুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে লিভোফ্লক্সাসিনের মাত্রা পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

লিভোফ্লক্সাসিন সাধারণতঃ বেশ সহনীয়। তদুপরি ইহা সেবনের ফলে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে বমি-বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া, পেটে ব্যথা, পেট ফাঁপা এবং বিরল ক্ষেত্রে আলোক সংবেদনশীলতা (০.১%)। খুবই বিরল কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে অনিচ্ছাকৃত কম্পন, বিষন্নতা, অস্থিরতা, মানসিক বিহীন ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থা এবং দুগ্ধদান উভয় অবস্থাতেই লিভোফ্লক্সাসিন নির্দেশিত নয় কেননা গর্ভস্থ সন্তান অথবা দুগ্ধসেব্য নবজাতকের উপর ইহার কার্যকারিতা জানা নাই।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

এন্টাসিড, আয়রন, জিংক যুক্ত মাল্টিভিটামিন এবং এডজরবেন্ট লিভোফ্লক্সাসিনের শোষণ কমায়।

মাত্রাধিক্যতা

লিভোফ্লক্সাসিনের মাত্রাধিক্যের ক্ষেত্রে পাকস্থলী ধৌত করা উচিত। রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং সঠিক হাইড্রেশন নিশ্চিত করা উচিত।

সংরক্ষণ

৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার উপরে সংরক্ষণ থেকে বিরত থাকুন। আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

প্যাকেজিং

লিভোনাল ৫০০ ট্যাবলেটঃ প্রতি বাক্সে আছে ৩×১০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

প্রস্তুতকারক
ন্যাশনাল ড্রাগ কোঃ লিমিঃ
বাসঙ্গলপাড়া, ধামরাই, ঢাকা।